

## گزارش کوتاه علمی

**گزارش میزانی زنبور *Hyposoter clausus* (Ichneumonidae: Campopleginae) پارازیتویید لارو سفیده‌ی کوچک کلم، کلم گل تهران از مزارع *Pieris rapae***

غلامحسین حسن شاهی<sup>۱</sup>، حبیب عباسی‌پور<sup>۱</sup>، ریجیو جاسیلا<sup>۲</sup>، فاطمه جهان<sup>۱</sup>، زهرا دوستی<sup>۱</sup>

۱- گروه گیاه‌پزشکی دانشگاه شاهد-تهران

۲- موزه‌ی جانورشناسی، دانشگاه تورکو، فنلاند

مسئول مکاتبات: حبیب عباسی‌پور habbasipour@yahoo.com

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۱/۱۱/۰۲

۹۵-۹۷ (۱)

تاریخ دریافت: ۱۳۹۱/۰۸/۰۶

### چکیده

*Pieris rapae* (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Pieridae) به منظور شناسایی پارازیتوییدهای سفیده‌ی کوچک کلم، کلم گل در جنوب تهران، در سال ۱۳۹۰ نمونه‌برداری صورت گرفت. در بین نمونه‌ها گونه‌ی از مزارع کلم گل برای اولین بار از از روی سفیده‌ی کوچک کلم و منطقه‌ی تهران گزارش می‌شود. گونه‌ی دیگر به نام *Cotesia glomerata* L. (Hymenoptera: Braconidae) نیز به عنوان *Hyposoter clausus* (Brischke, 1880) (Hymenoptera: Ichneumonidae) از مزارع کلم گل در جنوب تهران گردید. از گونه‌های دیگر که در این بررسی شناسایی گردید. از گونه‌های دیگر که در این بررسی شناسایی گردیدند، گونه‌ی *Cotesia glomerata* L. (Hymenoptera: Braconidae) می‌باشد که توسط دکتر Mark Shaw از کشور انگلستان مورد شناسایی قرار گرفت.

**واژه‌های کلیدی:** *Hyposoter clausus*، پارازیتویید لاروی، سفیده‌ی کوچک کلم، کلم گل، تهران

### در بین نمونه‌ها گونه‌ی *Hyposoter clausus*

(Brischke, 1880) (Hymenoptera: Ichneumonidae) برای اولین بار از از روی سفیده‌ی کوچک کلم و منطقه‌ی تهران گزارش می‌شود. این گونه توسط نگارنده‌ی سوم، شناسایی گردید. از گونه‌های دیگر که در این بررسی شناسایی گردیدند، گونه‌ی *Cotesia glomerata* L. (Hymenoptera: Braconidae) می‌باشد که توسط دکتر Mark Shaw از کشور انگلستان مورد شناسایی قرار گرفت. گونه‌ی *Hyposoter clausus* (Brischke, 1880) پارازیتویید داخلی و انفرادی لارو سفیده‌ی کوچک کلم می‌باشد. رفتار این پارازیتویید به صورت Koinobiont می‌باشد. از گونه‌های دیگر این جنس که در مزارع کلم فعالیت دارد گونه‌ی *Hyposoter exiguae* می‌باشد که روی لارو جنس‌هایی از خانواده Geometridae فعالیت دارد (*H. clausus*). (Smilowitz and Iwantsch, 1973) متعلق به زیرخانواده Campopleginae می‌باشد و با توجه

### مقدمه

به منظور شناسایی پارازیتوییدهای لارو و شفیره‌ی سفیده‌ی کوچک کلم، *Pieris rapae* (Linnaeus, 1758) (Lepidoptera: Pieridae)، در مناطق کلم کاری جنوب تهران، نمونه‌برداری از مزارع کلم گل در سال ۱۳۹۰ صورت گرفت. لارو و شفیره‌ی آفت پس از جمع آوری به آزمایشگاه انتقال داده شد. سپس نمونه‌ها در ظروف پلاستیکی به ابعاد  $15 \times 5 \times 5$  سانتی‌متر که درب آن با توری ارگانزا پوشیده شده بود، قرار گرفت و در شرایط دمایی  $22 \pm 2$  درجه‌ی سلسیوس، رطوبت نسبی  $65 \pm 2$  درصد و ساعت روشنایی تا زمان خروج زنبورهای پارازیتویید نگهداری شد. نمونه‌های جمع آوری شده‌ی آفت، به صورت روزانه بررسی شده و زنبورهای خارج شده، در الکل ۷۵ درصد نگهداری شد. پس از خروج پارازیتوییدها و شناسایی مقدماتی در سطح خانواده (Borror et al., 1989)، نمونه‌ها برای متخصصین ارسال شدند.

لبه‌ی پهن و دارای دو دندانه، بال جلو دارای آرئولت کوچک و بسته، بر جستگی‌های روی پروپودئوم کوتاه، آرئولا کوتاه، پتیول با سطح مقطع دایره‌ای از قفس سینه مجزا شده، تخم ریز بلند و تا حدود ۱/۵ سانتی‌متر، ران و پای عقب صاف و مایل به رنگ قهوه‌ای خرمایی.

این گونه از اسکاتلند، فلاند، اروپای غربی و مرکزی، پاکستان (Shaw *et al.*, 2011; Jussila & Várkonyi, 2008)، رومانی، آلمان، لهستان و فرانسه (Yu *et al.*, 2010) گزارش شده است.

به منابع موجود توسط رزمی و همکاران (۲۰۱۱) برای اولین بار از ایران از روی سفیده‌ی بزرگ کلم، (L.) *Pieris brassicae* گزارش گردید و این بار از مزارع کلم‌گل تهران گزارش می‌گردد. نمونه‌های اصلی آن به تعداد ۴ عدد در آزمایشگاه حشره‌شناسی دانشگاه شاهد نگهداری می‌شوند.

برخی از مشخصات شکل‌شناسی این زنبور به این شرح می‌باشد: اندازه‌ی بزرگ، بال جلو ۹ میلی‌متر، شاخک در جنس نر بدون زائده تیلوئید، و در ماده‌های دارای این زائده، کلیپنوس محدب، باریک و ساده، آرواره‌ی بالا کوتاه با

## References

- Borror, D.J., Triplehorn, C.A., Johnson, N.F. 1989.** An Introduction to the study of insects. Saunders College Publications, Saunders.
- Razmi, M., Karimpour, Y., Safaralizadeh, M., Hasan, Safavi, S.A. 2011.** Parasitoid complex of cabbage large white butterfly, *Pieris brassicae* (L.) (Lepidoptera, Pieridae) in Urmia with new records from Iran. Journal of Plant Protection Research, 51(3): 248-251.
- Smilowitz, Z. & Iwantsch, G. 1973.** Relationships between the Parasitoid *Hyposoter exiguae* and the Cabbage Looper, *Trichoplusia ni*: Effects of Host Age on Developmental Rate of the Parasitoid. Environmental Entomology, 2(5): 759-764.
- Shaw, M.R., Broad, G.R., Cathrine, C. & Harrison, M. 2011.** Scottish Invertebrate Species Knowledge Dossier: Hymenoptera: Ichneumonidae (Parasitoid Wasps 10). Buglife – The Invertebrate Conservation Trust, 31 p.
- Brischke, C. G. A. 1880.** Die Ichneumoniden der Provinzen West- und Ost-Preussen. Schriften der Naturforschenden Gesellschaft in Danzig, 4(4): 108-210.
- Jussila, R. & Várkonyi, G. 2008.** Suomelle uusia sekä maastamme huonosti tunnettuja ahmaspistiäislajeja (Hymenoptera, Ichneumonidae) I. Entomological Club of the Zoological and Botanical Society of Turku, Finland, 8: 1-11.
- Yu, D.S., van Achterberg, C. & Horstmann, K. 2012.** World Ichneumonoidea. Taxonomy, Biology, Morphology and Distribution (Braconidae). Taxapad (Scientific Names for Information Management) Interactive Catalogue. Ottawa, Online availavle at <http://taxapad.com>

## Short report

**Host report of *Hyposoter clausus* (Brischke, 1880) (Ichneumonidae: Campopleginae), a larval parasitoid of the cabbage white butterfly, *Pieris rapae* from cauliflower fields in Tehran**

**Gholamhosein Hasanshahi<sup>1</sup>, Habib Abbasipour<sup>1</sup>, Reijo Jussila<sup>2</sup>, Fatemeh Jahan<sup>2</sup> and Zahra dosti<sup>1</sup>**

1- Agricultural Sciences, Shahed University, Tehran

2- Zoological Museum, Section of Biodiversity and Environmental Sciences, University of Turku, Finland

**Corresponding Author:** Habib Abbasipour habbasipour@yahoo.com

---

**Received: Oct. 28, 2012**

**2 (1) 95-97**

**Accepted: Jan. 23, 2013**

---

### Abstract

A sampling was carried out to determin the parasitoid complex of the cabbage white butterfly, *Pieris rapae* in cauliflower fields at southern area of Tehran. The Ichneumonid parasitoid, *Hyposoter clausus* (Brischke, 1880) (Hymenoptera: Ichneumonidae, Campopleginae) was reared from the larvae of *Pieris rapae*, which is a new host record for this parasitoid and expand its area of distribution in Tehran. Another species *Cotesia glomerata* L. (Hymenoptera: Braconidae) was also reared from the larvae of cabbage white butterfly at the same region.

**Keywords:** *Hyposoter clausus*, larval parasitoids, *Pieris rapae*, cauliflower, Tehran

---