

ارزیابی عوامل خطر در بیماران کاندید ایمپلنت

دکتر فریال طالقانی

جراح و متخصص بیماریهای لثه

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد

در کنار رشد فزاینده کاربرد ایمپلنتهای دندانی با مشکلات و شکست تعدادی از آنها مواجه می شویم. احتمال شکست ایمپلنت در بین تمام افراد یکسان نیست و در گروه خاصی از بیماران افزایش می یابد. دلایل مختلفی برای شکست وجود دارد که از بین دلایل بیولوژیک، مکانیکال و رفتاری (behavioral) مهمترین می باشند. ارزیابی عوامل خطر بررسی دقیق تمام شرایطی است که می تواند بر نتایج یک مد درمانی اثر نامطلوب بگذارد. در مورد ایمپلنتهای درمانی ارزیابی باید شامل تعیین عوامل باشد که ریسک مشکلات منجر به از دست دادن ایمپلنت را افزایش می دهد. ارزیابی عوامل خطر بایستی در چندین مرحله انجام شود:

پیش از قرار دادن ایمپلنت

حین قرار دادن ایمپلنت و استواینتگریشن

در طی فاز نگهدارنده

بعد از شکست ایمپلنت و خارج ساختن آن

بطور کلی عوامل خطر را می توان به سه دسته بزرگ موضعی، سیستمیک و رفتاری کرد که به شرح هر یک می پردازیم.