

چکونگی انجام خودآزمایی سینه و عوامل مرتبط با آن

بابک مهاجری^۱, پریسا پیشویان^۲, قره‌اه جعفری^۳

۱. دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

۲. استادیار گروه پیدائش و پژوهشی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران ایران

مقدمه و هدف: یکی از شایع‌ترین سرطان‌های زنان، سرطان پستان است که متأسفانه یروز آن در حال افزایش است و در صورت تشخیص زود هنگام، درصد مرگ و میتو به مقدار قابل توجهی کاهش می‌یابد. خودآزمایی پستان یکی از روش‌های غربالگری این بیماریست که امروزه بر انجام منظم آن تأکید می‌شود ما در این مطالعه به بررسی نحوه‌ی عملکرد در این خصوص پرداخته‌ایم.

مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع مقطعی یا جنبه‌های توحیقی و تحلیلی بوده است. نمونه‌های مورد بررسی شامل ۴۹۶ نفر بودند که اطلاعات مورد نیاز به بوسیله پرسشنامه‌ای محقق ساخته، گردآوری و پس از ورود به کامپیوتر با نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمونهای کای سکوت، آنالیز واریانس و t-test مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

یافته‌ها: میانگین سن افراد مورد بررسی ۴۲/۲۲ سال با انحراف معیار ۸/۵ به دست آمد. اکثریت افراد مورد بررسی لیسانس (۷۰/۵٪) معلم (۱۶/۱٪) و استخدام رسمی (۷۸/۲٪) بودند. عمده افراد مورد مطالعه متاهل (۸۴/۲٪) بودند و میانگین تعداد فرزندان ۲/۳۱ با انحراف معیار ۰/۸۸ بدست آمد. ۳۳/۹٪ نعمت‌های اصولاً خودآزمایی سینه انجام می‌دادند. ۱۷/۷٪ به صورت منظم و ۴۹٪ هم به طور نا منظم اندام به خودآزمایی می‌کردند. در این تحقیق بین وضعیت تاہم ($p < 0.0001$)، سن ($p < 0.001$) و وضعیت استعمالی ($p = 0.18$) با انجام BSE آرتباط معنادار آماری بدست آمد.

نتیجه گیری: علی‌رغم اختلال و با توجه به ساده بودن، درصد بالایی از افراد خودآزمایی سینه انجام نداده بودند. که باید بر این مسئله تأکید بیشتری صورت یابد.

کلمات کلیدی: خودآزمایی سینه، خانمهای، عملکرد