



تشخیص افتراقی و درمان محافظه کارانه بد رنگی‌های دندانی توسط میکروابرژن و بلیچینگ

دکتر مهشید محمدی بصیر!

امروزه درمان محافظه کارانه بدرنگی‌های دندانی بخش وسیعی از درمان‌های زیبایی را به خود اختصاص داده است. این درمان‌های محافظه کارانه به دو روش microabrasion و bleaching صورت می‌گیرد. درمان‌های بلیچینگ معمولاً به صورت موثری موجب حذف بدرنگی‌های سطحی و عمقی مینا و عاج می‌گردد. از جمله این موارد می‌توان به بدرنگی‌های با منشأ خارجی هم چون انواع رنگ دانه‌های غذایی و نوشابه‌ها و نیز بدرنگی‌هایی با منشأ داخلی هم چون بدرنگی‌های ناشی از خانواده دارویی تتراسایکلین یا بدرنگی‌های ناشی از روند aging و افزایش سن اشاره نمود.

در روش میکرو ابرژن معمولاً بدرنگی‌های ناشی از اختلالات در مینرالیزاسیون که به دلیل محیطی رخ می‌دهد، درمان می‌شود. از جمله اختلالات در مینرالیزاسیون می‌توان به فلونورزیس دندانی و لکه‌های مات سفید لوکالیزه یا منتشر ناشی از تجمع پلاک اشاره نمود. تشخیص افتراقی این ضایعات در درمان موفق آن‌ها نقش به‌سزایی دارد.

این مقاله، با مروری بر عوامل ایجادکننده بدرنگی‌های دندانی و تشخیص افتراقی آن‌ها مروری اجمالی بر روش‌های محافظه کارانه درمانی آن‌ها شامل میکرو ابرژن و بلیچینگ خواهد داشت.

۱- متخصص دندان پزشکی ترمیمی و زیبایی، عضو هیات علمی دانشکده دندان پزشکی شاهد