

خلاصه مقالات



دومین کنگره سراسری ارتقای سلامت نوزاد

The 2nd Iranian Congress of Neonatal Health Promotion Jan 26-28, 2013 Mashhad, Iran

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد


با همکاری

معاونت محترم پژوهش دانشگاه علوم پزشکی مشهد

معاونت محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

انجمن متخصصین نوزادان شمال شرق کشور

مرکز تحقیقات نوزادان دانشگاه علوم پزشکی مشهد



خلاصه مقالات

دومین کنگره سراسری ارتقای سلامت نوزاد

مشهد، ۷-۹ بهمن ۱۳۹۱



رئيس کنگره: دکتر ریاب لطیف نژاد روتسی

دبیر علمی کنگره: سهیلا کربنده

دبیر اجرایی کنگره: امیررضا صالح مقدم

برگزار کننده

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

با همکاری

تعاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تعاونت محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

انجمن متخصصین نوزادان شمال شرق کشور

مرکز تحقیقات نوزادان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

محل کنگره

مشهد- خیابان دانشگاه، تالار رازی، دانشکده بهداشت

دومین گنره سراسری انتخای سلامت نوزاد
بررسی دیدگاه ماماهای در مورد نوع زایمان و ایمنی نوزاد

آزینا کیانی آسیابر، مucchomه حبدری، شفیقه محمدی تبار

اعضاء هیئت علمی دانشگاه شاهد، دانشکده پرستاری و مامایی شاهد kiani@shahed.ac.ir

زمینه و هدف: علیرغم تأکید سازمان بهداشت جهانی مبنی بر اینکه سازارین بیشتر از ۱۰۰-۱۵ درصد در هر جایی از دنیا منطقی نیستند، سازارین انتخابی در سالهای اخیر افزایش چشمگیری نشان می‌دهند و از معضلات سیستم بهداشتی قلمداد می‌گردند. از دلایل انتخاب سازارین توسط مادران، تکرش آنان نیست به این‌ها بودن سازارین برای نوزاد است. از آنجاییکه کارشناسان مامایی نقش اساسی در دادن اطلاعات و آموزش به والدین را دارند، بنابراین بررسی نگرش آنان در رابطه با این بودن نوع زایمان برای نوزاد حائز اهمیت است.

مواد و روشهای: بدین منظور مطالعه ای توصیفی- تحلیلی با هدف تعیین بررسی دیدگاه ماماهای در مورد نوع زایمان و ایمنی نوزاد بر روی ۳۲۵ نفر شاغل در بیمارستانها و مراکز بهداشتی شهر تهران سال ۱۳۹۰ انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات از طریق یک پرسشنامه شامل سوالات مربوط به ساقه کار، سن، محل کار، گذراندن دوردهای آزادگی برای زایمان فیزیولوژیک، سطح تحصیلات و محل اخذ مردک و سوالات مربوط به دیدگاه ماماهای در مورد نوزاد و سازارین انتخابی پس از تعیین اعتیاب و پایابی آن، استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج پژوهش، میانگین و انحراف معنی جامعه پژوهش را $\pm 7/49$ سال نشان داد. مهمترین عامل موافق با سازارین انتخابی در رابطه با نوزادان این بودن سازارین برای نوزاد (۳۵/۷٪)، شیوع بین دیسترس جنینی (۴۱/۵٪) و لای بودن ضربت هوشی نوزاد (۴۰/۹٪) در زایمان سازارین انتخابی عنوان شد. همچنین ارتباط معنی دار آماری بین نوع بیمارستان محل خدمت و نوع مردک تحصیلی با عقاید ماماهای در مورد ایمنی نوزاد با سازارین انتخابی، داشتن ساقه زایمان، پخش محل اشتغال و گذراندن دوره‌های زایمان فیزیولوژیک ماماهای در مورد کم بودن دیسترس جنینی در سازارین انتخابی با $p < 0.05$ بدست آمد.

نتیجه گیری: این بررسی نشان داد درصد بالایی از ماماهای موافق با سازارین انتخابی به دلیل اینکه معتقدند سازارین برای نوزاد ایمن بوده، دیسترس جنینی در سازارین کمتر و ضربت هوشی بالا در کودکان سازاری بیشتر است. بنابراین آموزش ماماهای در این خصوص حائز اهمیت است.