



هیومنیرالیزاسیون مولر و اینسیزورها: تشخیص، درمان و مشکلات آن

دکتر لاجل احمدی^۱، دکتر صدیقه مظفر^۲، دکتر سارا قدیمی^۳

^۱ متخصص دندان پزشکی کودکان، استادیار دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد، بخش کودکان

^۲ متخصص دندان پزشکی کودکان، استادیار دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد، بخش کودکان.

^۳ متخصص دندان پزشکی کودکان، استادیار دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران، بخش کودکان.

هیومنیرالیزاسیون مولر ها و اینسیزورها یکی از انواع اختلالات مینایی است که دندانهای درگیر را نسبت به پوسیدگی مستعد می‌سازد. این ضایعات معمولاً نقایص مینایی هستند که یک یا چند دندان مولر (معمولاً مولر های ا وگ دائمی) را درگیری کنند و می‌توانند همراه با بدون ضایعات مینایی در دندانهای اینترور دائمی باشند. نقایص مینایی موجود در این اختلال سبب به وجود آمدن حفره و عدم پیوستگی مینا و در نتیجه پوسیدگی های وسیع اولیه و ثانویه، حساسیت های پس از ترمیم، از دست رفتن ترمیم و یا دندان شود. با وجود نیاز بیشتر به ترمیم در این دندانها، به دلیل ساختار خاص این دندانها و سن پایین کودکان تحت درمان، درمانهای انجام شده اغلب با مشکلات زیاد برای کودک و دندانپزشک همراهند و گاهی ناموفقند. به دلیل نقایص ساختاری موجود اغلب این دندانها به خوبی بی حس نمی‌شوند که این عامل خود باعث مشکلات رفتاری در این کودکان می‌شود. با توجه به اهمیت دندانهای مولر دائمی و اینسیزور ها در عمل جویند، زیبایی و حفظ ارتفاع عمودی صورت، توجه به تشخیص زودهنگام و آگاهی از روشهای درمان و مشکلات جین و پس از درمان به نظر لازم است.