

مقاله مروری

ابزارهای متداول بررسی درد در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه: مرور ساختارمند

محمد عباسی^۱، دکتری پرستاری
رضا نوروززاده^۲، کارشناسی ارشد پرستاری
* بهمن آقایی^۳، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت‌های ویژه
علی معارفوند^۴، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت‌های ویژه
محمد ناطق^۵، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت‌های ویژه
یاسر سعید^۶، دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت‌های ویژه

خلاصه

هدف. هدف این مطالعه، مروری بر ابزارهای متداول بررسی درد در بخش مراقبت‌های ویژه می‌باشد. زمینه. درد به عنوان احساس ناخوشایند جسمی روحی و پدیده‌ای پیچیده در بین بیماران بخش مراقبت‌های ویژه شایع است. امروزه اهمیت درد تا آنجایی است که انجمن درد امریکا از آن به عنوان پنجمین علامت حیاتی نام می‌برد.

روش کار. در این مطالعه مروری ساختارمند با استفاده از کلید واژه‌های درد، تسکین درد، ابزارهای سنجش اندازه‌گیری بررسی درد و بخش مراقبت‌های ویژه در پایگاه‌های اطلاعاتی Scopus, Science Direct, PubMed, Cochran, CINHAL بدون محدودیت زمانی جست وجو انجام و سپس بر اساس میزان ارتباط مقالات با موضوع پژوهش و نظر اعصابی گروه تحقیق، مقالات مرتبط و مناسب انتخاب و تحلیل محتوا شدند.

یافته‌ها. در زمینه ابزارهای متداول بررسی درد، ۴۰ مقاله یافت شد. شش ابزار متداول بررسی درد که در بخش مراقبت‌های ویژه به کار گرفته می‌شوند شامل ابزار بررسی درد مراقبت ویژه، مقیاس رفتاری درد، ابزار رفتاری سنجش درد و مقیاس غیرکلامی درد، الگوریتم ارزیابی درد و مداخلات و ابزار ارزیابی غیرکلامی درد که در بزرگسالان و کودکان فاقد قدرت تکلم، در بخش مراقبت ویژه و برای پروسیجرهای دردناک استفاده می‌شود.

نتیجه گیری. با توجه به اهمیت مدیریت درد در بخش مراقبت‌های ویژه، اعضاء تیم درمان به خصوص پرستاران باید در ارزیابی درد از ابزارهای معتبر استفاده نمایند تا با کنترل درد بیماران بستری در این بخش‌ها، به تسريع فرایند بهبودی بیماران و استفاده درست از مسکن‌ها کمک نمایند.

کلیدواژه‌ها: درد، ابزار سنجش درد، بخش مراقبت ویژه

۱ استادیار، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران

۲ مربی، عضو هیات علمی دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

۳ کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت‌های ویژه، دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه شاهد، تهران، ایران (نویسنده مسئول) پست الکترونیک:

bahman.aghai@gmail.com

۴ کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت‌های ویژه، دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

۵ کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت‌های ویژه، دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

۶ کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت‌های ویژه، دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

مقدمه

درد، احساس ناخوشایند جسمی روحی و پدیده‌ای پیچیده است (هانکس و همکاران، ۲۰۱۱). امروزه اهمیت درد تا آنجایی است که انجمن درد امریکا از آن به عنوان پنجمین علامت حیاتی نام می‌برد (برونر و همکاران، ۲۰۱۰). درد پدیده‌ای شایع در بین بیماران بخش مراقبت‌های ویژه است (تپولوک-ورانیک و همکاران، ۲۰۱۰)، به گونه‌ای که از پنج میلیون نفری که سالیانه در بخش مراقبت‌های ویژه بستری می‌شند (پرونووست گوسچل، ۲۰۰۵)، حدود ۶۴ درصد آنها اظهار می‌کردند که زمانی که در این بخش‌ها بستری بوده‌اند درد را تجربه کرده‌اند (سولی و همکاران، ۲۰۱۲). عدم تسکین درد علی رغم پاسخ‌های فیزیولوژیک منفی مانند تغییرات عالیم حیاتی و هایپرکالمی می‌تواند تاثیرات منفی روانی نیز داشته باشد که از آن جمله می‌توان به دلیریوم، اضطراب و اختلال استرس پس از سانجه اشاره نمود (پوتیلو و همکاران، ۲۰۰۴). اکثر بیماران اظهار می‌کنند که دردشان در طی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه به طور کافی بررسی و مدیریت نشده است (پرونووست گوسچل، ۲۰۰۵) و تحقیقات نشان داده‌اند که عدم ارزیابی و مدیریت صحیح درد باعث افزایش مرگ و میر و ناخوشی می‌شود (شان و بوخال، ۲۰۰۳). در حضور بیماری یا خدمات تهدید کننده زندگی، بررسی و مدیریت درد اغلب به وسیله تیم بهداشتی نادیده گرفته می‌شود. ارزیابی درد در بخش مراقبت‌های ویژه اغلب به علت تغییر سطح هوشیاری به دنبال مصرف آرامبخش، تروما به سر و وضعیت فیزیولوژیک به تأخیر می‌افتد (پرونووست گوسچل، ۲۰۰۵). سنجش و مدیریت درد در بیماران تحت تهییه مکانیکی که عمدتاً دچار کاهش سطح هوشیاری شده‌اند و در این بخش‌ها بستری هستند دشوار است و از طرف پرستاران و پزشکان کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند (هال-لد و همکاران، ۱۹۹۸؛ سلطانیان و سرشت، ۲۰۱۲).

سیلر و همکاران (۲۰۰۸) در مطالعه‌ای که در مورد ارزیابی و کنترل ضددردها انجام دادند اعلام کردند که ۳۵ تا ۵۵ درصد پرستاران درد را کمتر از اندازه واقعی تخمین می‌زنند. اصلاح و همکاران (۲۰۰۳) اعلام کردند که اکثر پرستاران بخش‌های ویژه اصلاح نمی‌دانند چگونه درد را در بیماران با مشکل ارتباطی ارزیابی کنند. با وجود تلاش‌های صورت گرفته در دهه‌های اخیر در اداره درد بیماران، درد همچنان به عنوان یک عامل استرس‌زا بزرگ برای بیماران بستری در این بخش‌ها مطرح است (بوردن و همکاران، ۲۰۰۶). اثرات منفی بالینی در پی مدیریت ناموثر درد شامل ترومبوز عروق وریدی، آمبولی ریه، انفارکتوس میوکارد، پنومونی، التیام ضعیف زخم، بی خوابی و تضعیف روحیه که همگی این عوامل منجر به مشکل اقتصادی و پزشکی همچون افزایش طول اقامت در بیمارستان، پذیرش مجدد و نارضایتی بیماران می‌گردد (افپلیوم و همکاران، ۲۰۰۳). ارزیابی منظم و صحیح درد مزایابی دارد که از جمله آنها می‌توان به کاهش طول مدت بستری در بخش مراقبت‌های ویژه، کاهش طول مدت تهییه مکانیکی، کاهش میزان عفونت‌های بیمارستانی و افزایش رضایت بیماران اشاره نمود (گلیناس و همکاران، ۲۰۰۴؛ چانگواس و همکاران، ۲۰۰۶). با توجه به این که مشکلات مذکور به عنوان مانع جهت برقراری ارتباط کلامی موثر با بیماران محسوب می‌شوند، وجود مقیاس‌های رفتاری سنجش درد در این بیماران ضرورت پیدا می‌کند که از این مقیاس‌ها می‌توان به مقیاس رفتاری (Face, Leg, Activity, FLACC) در Cry, Consolability (BPS) که به طور رایجی جهت پایش درد نوزادان به کار گرفته می‌شود، مقیاس رفتاری درد یا (Behavior Pain Scale) (CPOT)، ابزار مشاهده درد در مراقبت ویژه یا (Critical-Care Pain Observation Scale) (NPAT)، مقیاس غیرکلامی درد یا (NVPS) Pain (Non Verbal Pain Scale))، الگوریتم ارزیابی درد و مداخلات (Assessment and Intervention Notation Algorithm) (Nonverbal Pain Assessment Tool) برقراری ارتباط نمی‌باشند، استفاده می‌شود اشاره نمود (سولی و همکاران، ۲۰۱۲). با عنایت به اهمیت تشخیص و مدیریت درد، در این مقاله، ابزارهای سنجش درد در بخش مراقبت ویژه معرفی و بررسی می‌شوند.

مواد و روش‌ها

در این مورخ ساختارمند با استفاده از کلیدواژه‌های درد، ابزارهای سنجش/اندازه‌گیری/بررسی درد و بخش مراقبت‌های ویژه در پایگاه‌های اطلاعاتی Ovid Science Direct, Scopus, PubMed, Cochran, CINHAL و Motor

جست و جوی Google Scholar و بدون محدودیت زمانی جست و جو انجام و سپس بر اساس میزان ارتباط مقالات با موضوع پژوهش و نظر اعضا گروه تحقیق، مقالات مرتبط و مناسب انتخاب و تحلیل محتوا شدند.

یافته ها

تعداد مقالات حاصل از جستجو ۴۰ مقاله بود و مقالاتی که اقدام به ساخت و معرفی ابزار جدید و مقالاتی که مستقیماً به بررسی توانایی این ابزارها در سنجش درد استفاده شده بودند وارد مطالعه شدند که تعداد این مقالات ۳۲ عدد بود. در نهایت، شش ابزار رایج بررسی درد در بخش مراقبت های ویژه که مستخرج از مقالات بود و روایی و پایابی آنها در کشورهای مختلف توسط محققان به اثبات رسیده است جهت برای معرفی و بررسی انتخاب شدند.

بحث

انتخاب روش های مورد استفاده برای این ارزیابی ها بر مبنای دانش ما از چگونگی درد، تجربه فردی به واژه ها یا احساسات ادرار کشیده توسط دیگران شکل می گیرد. این مقاله به ارزیابی درد در بخش مراقبت های ویژه می پردازد. بررسی درد در بیماران فاقد تکلم و بستری در بخش مراقبت های ویژه به واسطه شرایط بالینی پیچیده آنان با چالش های زیادی همراه است. پرستاران بخش مراقبت های ویژه برای بررسی این بیماران بیشتر از قضاوت بالینی، علائم رفتاری و گاهی علائم فیزیولوژیک استفاده می کنند که چندان معنیر نیست. شش ابزار رایج شامل NVPS, FLACC BPS, CPOT, PAIN algorithm و NPAT است که در بخش مراقبت های ویژه بزرگسالان و کودکان و برای بررسی درد پروسیجرهای دردناک آزمون گردیده اند. انجمن پرستاری مدیریت درد امریکا ابزارهای نامبرده را به عنوان ابزارهای معتبر در سنجش و مدیریت درد معرفی کرده است.

گلیناس (۲۰۰۴) روایی و پایابی ابزار مشاهده درد مراقبت ویژه (CPOT) را برای بیماران انگلیسی بستری در بخش مراقبت های ویژه و مزیت آن بر معیارهای فیزیولوژیک بررسی درد را نشان داد. این ابزار دارای ۴ چهار بخش است که هر بخش شامل یک گروه از رفتارهای متفاوت (حالت چهره، حرکات بدن، و انقباض عضلانی، هر کدام شامل سه آیتم و سازگاری با ونتیلاتور شامل چهار آیتم برای بیماران ایتنوبه یا قدرت تکلم برای بیماران اکستیوبه) است. بالاترین نمره ای را که یک بیمار می تواند بگیرد و نشان دهنده درد بالای بیمار است نمره ۸ و کمترین نمره که نشان دهنده عدم وجود درد است صفر است. بهادری زاده و همکاران (۱۳۹۰) در مطالعه ای جهت اندازه گیری درد ۱۵۰ بیمار تحت عمل جراحی قلب باز ایتنوبه شده نشان دادند که ابزار CPOT یک ابزار قوی در بررسی درد این بیماران است. همچنین، نوکابی و همکاران (۱۳۹۱) در بررسی تاثیر به کار گیری CPOT بر عملکرد پرستاران در ثبت و ارزیابی مجدد درد در بیماران با کاهش سطح هوشیاری نشان دادند که این ابزار منجر به بهبود عملکرد پرستاران در زمینه ارزیابی مجدد درد بیماران بعد از انجام اقدامات تسکینی شده است. همچنین، نتایج مطالعه کغانی و همکاران (۲۰۱۳) توانست از معتبر بودن این ابزار حمایت کند.

مقیاس رفتاری درد (BPS) توسط Payen و در سال ۲۰۰۱ ارائه شد. Payen و همکاران با بررسی روایی و پایابی این ابزار بر روی ۴۰ بیمار ترومای دیده در ناحیه سر و جراحی شده از ناحیه سر که همگی تحت تهویه مکانیکی بودند نشان دادند که این ابزار در بررسی درد این بیماران ابزاری روا و پایا است. این مقیاس ۳ قسمت اصلی دارد که هر قسمت نیز از ۱ تا ۴ امتیازدهی می گردد. مجموع حداقل امتیاز کسب شده از سه قسمت نمره ۱۲ (حداکثر درد) و حداقل نمره ۳ (حداکثر درد) می باشد.

(بوردن و همکاران، ۲۰۱۰). صفری و همکاران نیز با بررسی تاثیر آموزش بکار گیری ابزار BPS در پایش درد بیماران دچار کاهش سطح هوشیاری توسط پرستاران به این نتیجه رسیدند که پرستاران بعد از آموزش و آشنایی با این ابزار در تشخیص و مدیریت درد بیماران فاقد تکلم (دچار کاهش سطح هوشیاری) موثر بوده و پرستاران را در این زمینه توانمند ساخته است (صفری و همکاران، ۲۰۱۱). همچنین Aissaoui نشان داد که این ابزار یک ابزار معتبر و مطمئن در اندازه گیری درد بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه که قادری به تکلم نیستند می باشد (آسوایی و همکاران، ۲۰۰۵). Ahlers و همکاران نیز نشان دادند که این ابزار در سنجش درد بیماران سداتیو شده در پروسیجرهای دردناک بسیار مناسب و معتبر است.

(اهمرس و همکاران، ۲۰۱۰). مقیاس رفتاری (FLACC) در سال ۱۹۹۸ ارائه شد. واژه Face به معنای صورت، Legs به معنای پاهای، Activity به معنای فعالیت، Cry به معنای گریه کردن و Consolability به معنای راحتی است که مجموعاً دارای ۵ قسمت بوده و هر قسمت از صفر تا ۲ امتیازدهی می‌شود. حداقل نمره‌ای اکتسابی که نشان از عدم وجود درد است صفر و حداًکثر نمره ۱۰ که نشان از درد بالای بیمار است. Merkel و همکاران نیز روا و پایا بودن این ابزار در کودکان آمریکایی را نشان داد. این مطالعه که بر روی ۸۹ کودک ۲ ماه تا ۷ ساله که تحت جراحی قرار گرفته بودند انجام شده بود به این نتیجه رسید که این ابزار یک چارچوب ساده برای ارزیابی رفتارهای مرتبط با درد برای تیم درمان تهیه می‌کند (افپلبووم و همکاران، ۲۰۰۳). صادقی و همکاران در ارزیابی درد کودکان ۴-۶ از این ابزار استفاده کردند و در مطالعه خود نشان دادند که این ابزار در کودکان در این محدوده سنی مفید است (صادقی و همکاران، ۱۳۹۱) همچنین این ابزار دارای صحبت بالا در اندازه گیری درد کودکان بستری در بخش مراقبت‌های ویژه بدنیال ترومما، انکولوژی و جراحی معرفی گردیده است. تاکنون این ابزار به زبان‌های مختلف (فرانسوی، چینی، پرتغالی، سوئدی و ایتالیایی) روانسنجی شده است. حتی Nilsson و همکاران نشان دادند که این ابزار یک ابزار معتبر در اندازه گیری درد بیماران تا سن ۱۶ سال بستری در بخش مراقبت‌های ویژه نیز می‌باشد (Nilsson و همکاران، ۲۰۰۸). مقیاس غیرکلامی درد (NVPS) در سال ۲۰۰۳ ارائه شد. این ابزار به ۲ قسمت تقسیم می‌شود که قسمت اول قسمت رفتاری می‌باشد که شامل: حالات صورت، فعالیت/تحرک، گاردینگ و قسمت دوم قسمت فیزیولوژیک می‌باشد که شامل فشار خون، ضربان قلب و تعداد تنفس می‌باشد. هر قسمت از صفر تا ۲ نمره دهی می‌شود. حداقل و حداًکثر نمره اکتسابی صفر(حداقل درد) و ۱۰ (حداًکثر درد) می‌باشد. Odhner روانی و پایایی این ابزار را در ۵۹ بیمار دچار سوختگی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه را نشان داد (ادنر و همکاران، ۲۰۰۳). Marmo and Fowler در سال ۲۰۱۰ اعتبار این ابزار را بر روی ۲۵ بیمار بدحال بستری در بخش مراقبت‌های ویژه مورد تست و تایید قرار دادند (Marmo و Fowler، ۲۰۱۰).

الگوریتم ارزیابی درد و مداخلات (PAIN algorithm) در سال ۲۰۰۱ توسط Puntillo ارائه شد و شامل ۳ قسمت، ارزیابی درد، توانایی بیمار جهت تحمل اپوئیدها و تصمیم گیری درباره نحوه درمان با ضددردها تشکیل شده است. قسمت ارزیابی درد شامل دو بعد: فیزیولوژیک (افزاش تعداد ضربان قلب، تعداد تنفس، فشارخون، تعزیق و رنگ پریدگی) و رفتاری(حرکات، رفتاری) می‌باشد. این ابزار امکان داشتن یک رویکرد نظاممند در ارزیابی درد را امکان پذیر می‌سازد (پونتیلو و همکاران، ۱۹۹۷). ابزار ارزیابی غیرکلامی درد (NPAT) Klein در سال ۲۰۱۰ توسط ارائه شد. این ابزار شامل ۵ قسمت، احساسات، حرکات، نشانه‌های کلامی، نشانه‌های صورت و گاردینگ/ وضعیت بدن می‌باشد. هر بیمار از طیف نمره صفر تا ۱۰ می‌توانند نمره‌ای به خود اختصاص دهد که اعداد اکتسابی بالاتر نشان از درد بالای و بالعکس دارند (کلین و همکاران، ۲۰۱۰). Li و همکاران در بررسی اعتبار این ابزار بدنیال نتایج مطالعات خود به معتبر بودن این ابزار رسیدند (Li و همکاران، ۲۰۰۸).

نتیجه گیری

بررسی موثر و مداوم درد باعث بهبود در مداخله می‌گردد. عدم بررسی دقیق درد به خصوص در بیماران بسیار بدحال و آنها می‌باشد که قادر به برقراری ارتباط با مراقبین نیستند، می‌تواند عوارض و عواقب جبران ناپذیری بر جای گذارد. بنابراین با توجه به اهمیت بحث درد و مدیریت صحیح آن به نظر می‌رسد که استفاده از ابزارهای سنجش درد در بخش مراقبت‌های ویژه که از مزیت آنان کاربرد آسان در زمان کم است، دارای اهمیت فراوان بوده و مسئولان بیمارستان‌ها می‌توانند با عنایت به مطالعات انجام شده ابزارهای سنجش درد را در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه را به پرسنل درمان بخصوص پرستاران شناسانده و با توانمند ساختن آن‌ها برای مدیریت درد منجر به کاهش وقوع درد و طول مدت آن شده، به کیفیت مراقبت افزوده و در کاهش هزینه‌های بستری یاری رسانند.

منابع فارسی

بهادریزاده نسرین، قنبری عاطفة، فرمانبر ریبع‌الله، کاظم‌نژاد احسان. ارزیابی ابزار CPOT (ابزار مشاهده درد) در اندازه گیری شدت درد بیماران تحت عمل جراحی قلب باز مراجعه کننده به مرکز آموزشی-درمانی حشمت. ۱۳۹۰.

اسدی نوqابی اسدی احمد علی، قلیزاده گرددرباری، ذوالفاری میتر، مهران عباس. تاثیر بکارگیری ابزار مشاهده ای درد (CPOT) در بیماران چار کاهش سطح هوشیاری بر عملکرد پرستاران در ثبت و ارزیابی مجدد درد. *Maghez Hayat*, ۱۳۹۱، ۱۸(۳)، ۵۴-۶۵.

صفری محمود، صریقی لادن، فلاحت نیا غلامحسین، رحیمی بشر فرشید، سلطانیان علیرضا، نیکوسرنشت مهشید. بررسی تاثیر بکارگیری مقیاس سنجش رفتاری درد در پایش درد بیماران چار کاهش سطح هوشیاری. *Faslnamehameh علمی پژوهشی بیهودی و درد*, ۱۳۹۱، ۲۲(۱)، ۳-۲۸.

صادقی طاهره، شمشیری محمود، محمدی نورالدین شوقی مهناز. تاثیر انحراف فکر بر واکنش های رفتاری درد حین باز کردن راه وریدی در کودکان ۴-۶ سال. *Nashriyeh Hayat*, ۱۳۹۱، ۱۸(۴)، ۹-۱۸.

منابع انگلیسی

- AHLERS, S. J., VAN DER VEEN, A. M., VAN DIJK, M., TIBBOEL, D. & KNIBBE, C. A. 2010. The use of the Behavioral Pain Scale to assess pain in conscious sedated patients. *Anesthesia & Analgesia*, ۱۱۰, ۱۳۳-۱۲۷.
- AISSAOUI, Y., ZEGGWAGH, A. A., ZEKRAOUI, A., ABIDI, K. & ABOUQAL, R. 2005. Validation of a behavioral pain scale in critically ill, sedated, and mechanically ventilated patients. *Anesthesia & Analgesia*, ۹۱, ۱۴۷۶-۱۴۷۰.
- APFELBAUM, J. L., CHEN, C., MEHTA, S. S. & GAN, T. J. 2003. Postoperative pain experience: results from a national survey suggest postoperative pain continues to be undermanaged. *Anesthesia & Analgesia*, ۹۷, ۵۴۰-۵۳۴.
- ASLAN, F. E., BDIR, A. & SELIMEN, D. 2003. How do intensive care nurses assess patients' pain? *Nursing in critical care*, 8, ۶۷-۶۲.
- BRUNNER, L. S., SMELTZER, S. C. C., BARE, B. G., HINKLE, J. L. & CHEEVER, K. H. 2010. *Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing*, Lippincott Williams & Wilkins.
- CHANQUES, G., JABER, S., BARBOTTE, E., VIOLET, S., SEBBANE, M., PERRIGAULT, P.-F., MANN, C., LEFRANT, J.-Y. & ELEDJAM, J.-J. 2006. Impact of systematic evaluation of pain and agitation in an intensive care unit*. *Critical care medicine*, 34, ۱۶۹۹-۱۶۹۱.
- GELINAS, C., FORTIER, M., VIENS, C., FILLION, L. & PUNTILLO, K. 2004. Pain assessment and management in critically ill intubated patients: a retrospective study. *American Journal of Critical Care*, 13, ۱۳۶-۱۲۶.
- HALL-LORD, M. L., LARSSON, G. & STEEN, B. 1998. Pain and distress among elderly intensive care unit patients: comparison of patients' experiences and nurses' assessments. *Heart & Lung: The Journal of Acute and Critical Care*, 27, ۱۳۲-۱۲۳.
- HANKS, G., CHERNY, N. I., CHRISTAKIS, N. A., FALLON, M., KASSA, S. & PORTENOY, R. K. 2011. Oxford textbook of palliative medicine. *FAMILY MEDICINE*, 43, ۱۳۱.
- KEANE, K. M. 2013. Validity and Reliability of the Critical Care Pain Observation Tool: A Replication Study. *Pain Management Nursing*, 14, e۲۱۶-e۲۲۰.
- KLEIN, D. G., DUMPE, M., KATZ, E. & BENA, J. 2010. Pain assessment in the intensive care unit: Development and psychometric testing of the nonverbal pain assessment tool. *Heart & Lung: The Journal of Acute and Critical Care*, 39, ۵۲۸-۵۲۱.
- LI, D., PUNTILLO, K. & MIASKOWSKI, C. 2008. A review of objective pain measures for use with critical care adult patients unable to self-report. *The journal of pain*, 9, ۱۰-۲.
- MARMO, L. & FOWLER, S. 2010. Pain assessment tool in the critically ill post-open heart surgery patient population. *Pain Management Nursing*, 11, ۱۴۰-۱۳۴.
- NILSSON, S., FINNSTRM, B. & KOKINSKY, E. 2008. The FLACC behavioral scale for procedural pain assessment in children aged ۰-۶-years. *Pediatric Anesthesia*, 18, ۷۷۴-۷۶۷.
- ODHNER, M., WEGMAN, D., FREELAND, N., STEINMETZ, A. & INGERSOLL, G. L. 2003. Assessing pain control in nonverbal critically ill adults. *Dimensions of critical care nursing*, 22-۲۶.
- PRONOVOOST, P. & GOESCHEL, C. 2005. Improving ICU care: it takes a team. *Health Exec*, 20, ۲۲-۱۴.
- PUNTILLO, K. A., MIASKOWSKI, C., KEHRLE, K., STANNARD, D., GLEESON, S. & NYE, P. 1997. Relationship between behavioral and physiological indicators of pain, critical care patients' self-reports of pain, and opioid administration. *Critical care medicine*, 25, ۱۱۶۶-۱۱۵۹.
- PUNTILLO, K. A., MORRIS, A. B., THOMPSON, C. L., STANIK-HUTT, J., WHITE, C. A. & WILD, L. R. 2004. Pain behaviors observed during six common procedures: Results from Thunder Project II*. *Critical care medicine*, 32, ۴۲۷-۴۲۱.

- SESSLER, C. N., GRAP, M. J. & RAMSAY, M. A. 2008. Evaluating and monitoring analgesia and sedation in the intensive care unit. *Crit Care*, ۱۲, S1.
- SHANNON, K. & BUCKNALL, T. 2003. Pain assessment in critical care: what have we learnt from research. *Intensive and Critical Care Nursing*, 19, 162-154,
- SOLE, M. L., KLEIN, D. G. & MOSELEY, M. J. 2012. *Introduction to Critical Care Nursing6: Introduction to Critical Care Nursing*, Elsevier Health Sciences.
- SOLTANIAN, A. R. & SERESHT, M. N. 2012. The effectiveness of Behavioral Pain Scale in the assessment of pain in patients with low level of consciousness. *Anesthesiology and Pain*, ۳۱, ۱۰-۲۲,
- TOPOLOVEC-VRANIC, J., CANZIAN, S., INNIS, J., POLLMANN-MUDRYJ, M. A., MCFARLAN, A. W. & BAKER, A. J. 2010. Patient satisfaction and documentation of pain assessments and management after implementing the adult nonverbal pain scale. *American Journal of Critical Care*, 19, 354-340,
- URDEN, L., STACY, K. & LOUGH, M. 2010. *Critical Care Nursing: Diagnosis and Management*, St. Louis: Mosby. Inc.
- URDEN, L. D., STACY, K. & LOUGH, M. 2006. *Critical care nursing. Diagnosis & Management*.
- WIBBENMEYER, L., SEVIER, A., LIAO, J., WILLIAMS, I., LATENSER, B., ROBERT LEWIS, I., KEALEY, P. & ROSENQUIST, R. 2011. Evaluation of the usefulness of two established pain assessment tools in a burn population. *Journal of Burn Care & Research*, 32, 60-62 ,

Review Article

Evaluation of pain assessment tools intensive care units

Mohamad Abbasi¹, Ph.D

Reza Norozzade², MSc

* Bahman Aghai³, MSc

Ali Maarefvand⁴, MSc

Mohammad Nategh⁵, MSc

Yaser Saaid⁶, MSc

Abstract

Aim. The aim of this study was a review on common pain assessment tools which are used in critical care units.

Background. Pain is an unpleasant physiological and psychological feeling and a complex phenomenon which is common among patients in critical care units. Nowadays, the importance of pain is to the extent that the American Pain Association named it as the fifth vital sign. Pain relief is an important issue to improve patient outcomes in the intensive care units. Accordingly, nurses must be sensitive in precise pain assessment.

Method. In this review article, six pain assessment tools were selected based on the keywords "pain", "pain relief", and "pain assessment tools" from the databases Ovid, PubMed, Cochran, CINHAL, Science Direct, Scopus, and Google Scholar .

Findings. Among articles on pain assessment tools, 40 articles were selected. There are six common pain assessment tools used in critical care units including Critical Pain Observation Tool (CPOT), Behavioral Pain Scale (BPS), behavioral pain assessment tool (FLACC), Non-Verbal Pain Scale (NVPS), Pain Assessment and Intervention Notation (PAIN) algorithm and Nonverbal Pain Assessment Tool (NPAT) which are used in adult and pediatric patients with verbal impairment and for painful procedures.

Conclusion. According to the importance of pain management in intensive care units, nurses must particularly apply valid tools for pain assessment to facilitate healing process and use of pain medications properly.

Keywords: pain, intensive care, pain assessment tool

1 Assistant professor, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran

2 Senior Lecturer, Faculty of Nursing, Shahed University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 Master of Science in Critical Care Nursing, Shahed University of Medical Sciences, Tehran, Iran (*Corresponding Author) E-mail: bahman.aghai@gmail.com

4 Master of Science in Critical Care Nursing, Shahed University of Medical Sciences, Tehran, Iran

5 Master of Science in Critical Care Nursing, Shahed University of Medical Sciences, Tehran, Iran

6 Master of Science in Critical Care Nursing, Shahed University of Medical Sciences, Tehran, Iran