

پنجمین همایش سراسری راهکارهای ارتقای سلامت و چالش‌ها

با محوریت خودمراقبتی (Self Care)



دکتر حسن علی‌پور

کد ۱۱۷۷

خودمراقبتی در سرطان دهانه رحم بر اساس مدل مراحل تغییر رفتار

کبری خواجه شجاعی^۱، ناهید خلدی^۲، دکتر اشرف پیراسته^۳

- مربی گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی، مامایی، بهداشت مادر و کودک، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران
- مربی گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی، علوم بهداشتی در تغذیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران
- استادیار گروه بهداشت و پزشکی اجتماعی، دکترای آموزش بهداشت، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران

prskhajavi@yahoo.com

مقدمه و هدف: سرطان دهانه رحم شایع ترین عامل مرگ زنان در کشورهای در حال توسعه است که به دلیل دارا بودن یک دوره طولانی قبل از تهاجم، در دسترس بودن برنامه غربالگری مناسب و درمان موثر ضایعات اولیه به عنوان یک سرطان قابل پیشگیری شناخته شده است. با توجه به اینکه تست پاپ اسمایر که یک تست ارزان و موثر در غربالگری سرطان دهانه رحم است و در سیستم بهداشتی کشور انجام می‌شود، اما مطالعات مختلف نشان دهنده‌ی عدم استقبال از این تست می‌باشد پژوهش حاضر باهدف سنجش میزان خودمراقبتی براساس تعیین مراحل تغییر رفتار انجام شد.

مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی است که به صورت مقطعی در بهمن ماه ۹۲ در مراکز بهداشتی درمانی شرق تهران بر روی ۲۰۰ نفر از زنان متاهل انجام شد. ایزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه بود که شامل: سئوالات دموگرافیک، سئوالات سازه خودکارآمدی، سئوالات مراحل تغییر رفتار و سئوالات مربوط به سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی بود. داده‌ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۶) و آزمون‌های آماری کای دو، تی مستقل، همبستگی اسپرمن و رگرسیون لوگستیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
 $P \leq 0.105$

یافته‌ها: افراد مورد مطالعه از نظر سن، بین ۱۸ تا ۷۰ سال با میانگین سنی $46 \pm 15/15 \pm 88/88$ بودند. مدت ازدواج $11 \pm 32/32 \pm 10/41$ سال بود، از نظر شغل، خانه دار (۶۶٪) بود. از شرکت کنندگان تاکنون تست پاپ اسمایر انجام نداده بودند. نتایج مطالعه در زمینه مراحل تغییر رفتار تست پاپ اسمایر نشان داد ۱۲۲ نفر (۶۱٪) آنان خود مراقبتی (مجموع مراحل عمل و بقاء) داشتند. بین خودکارآمدی زنان مورد مطالعه و خود مراقبتی آنها در انجام تست پاپ اسمایر، ارتباط آماری معنی داری وجود نداشت ($P < 0.33$).

استنتاج: در این مطالعه زنان علیرغم خودکارآمدی بالا از نظر خود مراقبتی جهت انجام تست پاپ اسمایر در سطح پایین بودند. که این می‌تواند مربوط به شرایط و ویژگی تست پاپ اسمایر باشد.

کلمات کلیدی: خودمراقبتی، سرطان دهانه رحم، مرحل تغییر رفتار، پاپ اسمایر